

עליה עולמית בתחום סטרפטוקוק א:

■ בהלת סטרפטוקוק: הדיווחים מאירופה אודות עליה בתחום ובקרי מות מהחידק הפולשיי בקרב ילדים מתחת לגיל עשר, מעוררים חששות בקרב רשוות הבריאות בעולם ■ גם משרד הבריאות בישראל הוציא אזהרה שנועדה להעלות את המודעות של הצוותים הרפואיים. האם קיים חשש אמיתי? פروف' אפי בילסקי מנהל היחידה למחלות זיהומיות בשניידר, מרגיע: "בכל חורף יש עליה. בישראל, כרגע אלו רק כותרות" ■ עונת החורף הנוכחית, משופעת במחולי מחלת. כיצד נדע להבדיל בין הקורונה, השפעת, נגיף ה затהנות וחידק הסטרפטוקוק? פروف' בילסקי: "אין מקום לבלה, על ההורים להתנהג כרגע. במקרה של חום וכאב גרון, גשו לרופא הילדים לבדיקה!" ■

כשהחידק חוטף קדחת

פרופסור בילסקי: "קל מאוד לבחין ביניהם - מסתכים בלווע. אם הגרון מודד אדום או שיש תפליטים לבנים (מוגלטים), זו לא קורונה. אם אין כלום בגרון, זה לא סטרפ. דלקת גרון סטרפטוקוקית מאופיינית בחום נוכחות תפליטים מוגלתיים בגרון, ללא שיעול/נולת".

שני זנים שונים

קצת מבבל. סטרפטוקוק A יכול הגיעו בדמותו של חידק שכיה שגורם לדלקת גרון 'מיןורית', והוא עלול להפוך לחידק הטורף. מדובר במחלת חמורה ומסכנת חיים. מה גורם לו להפוך לחידק פולשני? איך אפשר להזות מתי דלקת גרון יכולה תחתה לחידק הטורף?

פרופ' בילסקי מרגיע: "דלקת גרון לא תhapeך לחידק הטורף. מדובר בשני זנים שונים של חידק הסטרפטוקוק. ה'סטרפ' של הלוע עוזה לדלקת גרון, לא נעים אבל לווב לא נורא. ישנים זנים שהם פוגעים בשירים ובקרמות וועשים זיהום עורני קשה, והם דור לכנים החידק הטורף".

או מה הורים צריכים לעשות, לאור החששות מסטרפטוקוק 'טורף'? **פרופ' בילסקי:** "על ההורים להתנהג כרגע. גשו לרופא ילדים במקורה של חום וכאב גרון לבדיקה. באם הרופא רואה ממצאים אופייניים בגרון של ילד בגיל המתאים, עליו לקחת משטח גרון ולהחטיב על טיפול על פי הנקודות המקובלות. אגב, ההמלצה שמופיעה באציגי התק绍ות יש לקחת משטח גרון על כל כבב גרון" היא פשטוט שיטה גמורה. לא צריך להכניס להבללה מכל מה ששמעים מסביב - יש לגשת לדופא הילדים לבדיקה ולהערכה, והוא יקבל את החלטתך".


כדי לדעת שדלקת גרון מסטרפטוקוק אינה שכיחה מתחת גיל שלוש שנים, ולכן לווב לא ממצאים משטח גרון ולא נותנים אנטיביוטיקה.

אסור לזלزل

גם בסטרפטוקוק מזון המצוי, ש"رك" גורם דלקת גרון קוונטיציונית, אין לזלزل. כפי שהזכרנו בפתח הדברים, סטרפטוקוק A לא מתופל עלול לצאת למסלול מסוכן בגוף, מדלקת גרון היישר אל המפרקים ואל מסתמי הלב.

הרבייה דלקות הגרון הן ויראליות - כאשר הגורם הוא נגיף. מיועט, גורם על ידי סטרפטוקוק. וגם במרקחה זה, דלקת הגרון החידקית עוברת עצמה בדרך כלל. עם זאת, בכאהו מהמרקמים, החידק עלול לגרום לסיבוכים. התרחיש הקלסטי הוא של ילד שובל מחום וכאבי גרון, ההורם לוקחים אותו לרופא או שלא. הרופא מאבחן סטרפטוקוק ורורם ההורם לזרק - ההורים מתחים והרואה יורד ונראת שהילד אנטיביוטיקה. אלא שלאחר מספר שכבות, הילד עלול לפתח סיבוך של מחלים. אף עליה דלקת שנקראת קדחת השיגרון ומתרבתת בכאבים סטרפטוקוק A, חום, דלקת של הלב וזיהום של המסתומים.

בשל החשש הזה, בכל מקרה של אי-בחן סטרפטוקוק בגרון - ניתן



טיפול אנטיביוטי שנועד למניעת התפשטות החידק ואת הסיבוכים. האנטיביוטיקה עיליה למניעת סיבוכי החידק גם אם היא ניתנת מספר ימים לאחר התחלת המחלת - וכך גם במרקם רוביים ניטרליים לתוצאה של משטח גרון, כדי להימנע מטיפול מיותר באנטיביוטיקה (דבר שמאביר את התופעה של עמידות חידקים לאנטיביוטיקה). בחילק מהמרקם, על פי שיקול דעתו של הרופא (למשל כשהחולה סובב מוחם גבוה וכאבי גרון חזק), הוא יתחיל מידית בטיפול האנטיביוטי בלי להמתין למשטח. שאלת שמעיטה ההורם רביים, בייחוד משפחות מרובות ילדים: אצל חלק מהילדים אובחנה דלקת גרון סטרפטוקוקית שוב ושוב, לעיתים 3-4 פעמיים ויוטר במשך חורף אחד. ההורם נוטים להתעלם כשמדובר בדלקת גרון קלה יחסית וביחסו ייחודה לאלה ההורם גורם לא-טיפולני. ההורם נוטים לחשוף במשפחות עם הרובה ילדים.マイידך מדורר בסטרפטוקוק שמזוהים אוטונומית מפה. האם יש בהחלה עם נסיעה עליונות, זיהומים שכחניים יותר באירופה, בעיקר מאנגליה, על עלייה במספר המקרים של זיהום בסטרפטוקוק A. בילדים ובמבוגרים. ההסבר לעלייה במרקם הוא ככל הנראה החורף... בכל חורף רופאי ילדים רואים עליה במספר דלקות הגרון הנגרמות מסטרפטוקוק. יתרון ויש קשר לזיהומים וירליים בדרכי נשימה עליונות, זיהומים שכחניים יותר בחורף ואחריהם לפעים מגיע' זיהום בסטרפ. באירופה יש בהחלה עלייה במספר המקרים. עדין אין מספיק מידע, זה מה שהוא שרוויות הבריאות במספר מדינות צרכות לחזור ולהבין. בישראל, כרגע אלו רק כותרות. אין נתונים רשמיים ואין כרגע דיווחים ידועים מהאזור על חילואת חרינה. כרגע המספרים המדוחים הם בגבול הסביר כמו בכל שנה. אין ספק שיש לנטר ולעקב ולראות שאויה מגמה שאולי קורה במקומות אחרים בעולם לא מגיעה גם אלינו".

באופן מעשי, אין מבדלים בין כאבי גרון שנגרמים בגל קורונה או ה затהנות עונתית, לכABI גרון שנגרמים בגל סטרפטוקוק? ■

ב. קצין

סטרפטוקוק A, או בקיצור 'סטרפ', בעגה החביבה על הרופאים, מוכר גם בגין הקללה והנפוצה שלו כטרבל-מייקר. חידק שעלול לעבו מוגרין אל המפרקים ואל מסתמי הלב ולגרום לקדחת השיגרין. אבל בגין הנדרה האלימה שהלו, מדובר בחידק שידוע כינויו "ההידק הטורף". לא ייפלא שדיוחים אודות מכת סטרפטוקוק עולמית, מעוררים חלהלה גם בקרב רשוות הבריאות. מוכרים מקרים מקרים בבריטניה דוח על התהוותם מאירופה החלו לוץ' כבר לפני החדש. בבריטניה דוח על שירותים רפואיים של ילדים, יותר ממאה בקרב מוגרינים. אחד המקרים הטורגיים שנחשפו, הוא של פועלו בן שניים מופיעון בקהילה היהודית בדורות הרטפורדשייר באנגליה. דיווחים על תמותה מסטרפטוקוק A פורסמו גם בספרד ובצרפת, הולנד ושבדיה. מרבית מקרים התחלו באירועים ומהותם, היו בקרוב ילדים בני עשר ומטה.

מדובר, חשוב להזכיר ולציין, בחידק שפורסם בבריטניה בדרכם קבע לדלקות גרון ושיכחו עולמה מדי חורף, ובמרקמים נדרים - עלול לגורום ליזהום פולשני מסכן חיים. מדי שנה ישם מקרים מות מחלת כליה המשמעה שחולול דאגה לשויות הבריאות באירופה, היה העלייה המשמעותית בתחלואה ובתמותה מזוהומי סטרפטוקוק פולשניים. ארגון הבריאות העולמי, בשיתוף המרכז האירופי לבקרת מחלות, ומקרים התהוות מושתפת מפני עלייה בשיעור הזיהומים ומקרים התהוות של ילדים מסטרפטוקוק A, החידק שידוע כינויו "ההידק הטורף".

גם בישראל, נרשמה עלייה משמעותית בתחום החידק. בתקורת דוחות כי מספר הזיהומים מסטרפטוקוק השנה, בהשוואה לשנה שערובה, כמעט והכפיל את עצמו. בשבוע האחרון, בעקבות הדיווחים המודגימים של ארגון הבריאות העולמי, פירסם משרד הבריאות בישראל אזהרה מפני עלייה בתחום החידק מסטרפטוקוק A - במטרה להעלות את המודעות של הוצאות הרופאים לנושא ולהזכיר להם את חובת הדיווח על כל מקרה של "סטרפטוקוק גורף A" פולשני.

פרופ'AMILIA אניס מנהלת האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות,

מצינית במכון שנשלח למנהל בית החולים ולרופאים בקורופת,

כى על פי נתוני המרכז הארצי לסתטרפטוקוקים בישראל, בתקופת הקורונה נפתחה ירידה במספר המקרים - אולם החל מאמצע 2021 חלה עלייה והמספרים ממשיכים להיות גבוהים גם במהלך 2022. עם זאת, אניס הרגישה: עדין לא ברור אם מדובר בתחום החידק מסטרפטוקוק A - במטרה להעלות את המודעות של הוצאות הרופאים לאנשי רפואיים ורופאים ולזהזכיר להם את חובת הדיווח על כל מקרה של "סטרפטוקוק גורף A" פולשני.

העונה החמה

הchorf הוא 'העונה החמה' לירוסים וחידקים למיניהם. הילד מפתה משחו, עם או בלי חום, תסמיini צינון וכאבים בגרון, ושהנה נספה אליהם גם נגיף מושפעת במחולי מחלת למיניהם, והשנה נספה אליהם גם נגיף הקורונה, חידק הסטרפטוקוק, וירוס השפעת וכמה מאות נגיף ה затהנות נפוצים.

איך נדע להבדיל בין היחידה למחלה למיניהם. הילד מפתה שעלולה להיות סטרפטוקוקית? ובכלל, לאור העלייה בשיעורי הקורונה, במצבות שבבה רוב האוכלוסייה לא טורחים להסביר, איך נדע שלא מדובר בקורסונה?

פרופ' אפי בילסקי מנהל היחידה למחלה למיניהם בשיידר, מרגע בעקבות בהילת הסטרפטוקוק: "בשבועות האחרונות יש דיווח ממספר מדינות באירופה, בעיקר מאנגליה, על עלייה במספר המקרים של זיהום בסטרפטוקוק A. בילדים ובמבוגרים. ההסבר לעלייה במרקם הוא ככל הנראה החורף... בכל חורף רופאי ילדים רואים עליה במספר דלקות הגרון הנגרמות מסטרפטוקוק. יתרון ויש קשר לזיהומים וירליים בדרכי נשימה עליונות, זיהומים שכחניים יותר בחורף ואחריהם לפעים מגיע' זיהום בסטרפ. באירופה יש בהחלה עלייה במספר המקרים. עדין אין מספיק מידע, זה מה שהוא שרוויות הבריאות במספר מדינות צרכות לחזור ולהבין. אין ספק שיש לנטר ולראות שאויה מגמה שאולי קורה במקומות אחרים בעולם לא מגיעה גם אלינו".