



## מכון קיפר לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית

# תוכנית פעולה לטיפול מיידי בתגובה אלרגית אנפילקטית לאחר חיסון

### מתן מיידי של אפיפן בהופעת התסמינים הבאים לאחר חיסון:



חולשה כללית  
ערפול הכרה



בחילה  
הקאות



קושי בבליעה  
צרידות



תפרחת  
מפושטת




חיוורון  
דופק חלש  
התעלפות




קושי בנשימה  
שיעול


### הוראות שימוש במזרק אפיפן:




הוצאת המזרק ועיסוי אזור ההזרקה במשך 10 שניות. לאחר ההזרקה, המחט הוצאת המזרק, המחט תכוסה באופן אוטומטי



נעיצת המזרק בזווית של 90° לירך עד לשמיעת "קליק" והחזקתו במשך 3 שניות



קרוב הקצה הכתום לחלק החיצוני של הירך



אחיזת המזרק בכף יד מאוגרפת כשהחלק הכחול כלפי מעלה, בעזרת היד השניה הסרת המכסה הכחול

### לאחר מתן האפיפן:

1. להתקשר למד"א 101.
2. להשכיב את המטופל על הגב. במקרה של קושי בנשימה יש להושיבו.
3. לדאוג להעברה לבדיקה רפואית והשגחה במיון.
4. יש לדווח לצוות הרפואי על שעת השימוש במזרק.

יש להביא את המזרק למרפאה ביום החיסון. מטופל ללא מזרק אישי לא יחוסן. נשיאת המזרק חיונית ביום החיסון בלבד (אין צורך בנשיאתו באופן קבוע).