



مرصد شنايدر للأطفال في إسرائيل  
مركز شنايدر لطب الأطفال في إسرائيل  
Schneider Children's Medical Center of Israel

بكاء الطفل بشكل متواصل من الممكن أن يسبب إلى إحباط، غضب، وفقدان السيطرة لدى الأهل، بالأخص في حالات التعب. ومن الممكن أن يلجؤوا إلى هزّ الطفل.

**ما هي ظاهرة هزّ الطفل؟**  
الهزّ يحدث عندما يقوم شخص بالغ بالإمساك بجسم الطفل، بذراعيه أو بأضلاعه وهزّه هرّاً عنيفاً.

**ماذا يحدث إثناء هزّ الطفل؟**  
رأس الطفل كبير وتقليل نسبة إلى باقي جسمه وعضلات رقبته ضعيفة. ونتيجة لذلك، يتحرك رأس الطفل إلى الأمام وإلى الوراء دون أن يستطيع أن يسيطر عليه، مما قد يؤدي إلى ضرر كبير لدماغ الطفل. عندما نهزّ الطفل هرّاً عنيفاً يرتفع دماغه بجدار الجمجمة، والأوعية الدموية تتسع، مما قد يؤدي إلى تمزقها وإحداث نزيف داخلها. هزّ الطفل قد يؤدي إلى بقع دموية داخلية، أضرار دماغية دائمة، أو حتى الموت.

تذكروا،  
البكاء ليس خطراً، الهزّ بلا!  
ممنوع هزّ الأطفال!



## بكاء الطفل ومخاطر الهزّ

**من المهم:**  
من المهم أن نعرف أن بكاء الطفل طبيعي، حيث إنه وسيلة للتواصل مع بيئته. غالبية الأطفال يكونون لبعض ساعات خلال اليوم، وهذا لا يعني أن الأهل مذنبون.

**كيف علينا أن نتصرف عند بكاء الطفل؟**  
اهتماموا بتلبية حاجاته الأساسية: جوع، تعب، وجع، برداحر، حفاظة ممتلئة.



**حاولوا تهدئة الطفل عن طريق:**

- ✓ عناق، طبطبة أو هزّ خفيف
- ✓ إسماعه موسيقى هادئة
- ✓ حمام دافئ
- ✓ نزهة في العربة

**حاولوا تهدئة أنفسكم عن طريق:**

- ✓ التنفس العميق
- ✓ ضعوا الطفل في مكان آمن، وأخرجوا من الغرفة وحاولوا أن تهدوا.
- ✓ اطلبوا المساعدة من شخص قريب
- ✓ إذا أحوج الأمر، توجهوا لطلب استشارة مهنية