מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
קפלן 14 פתח-תקווה, 49202
היחידה לתזונה ודיאטה
טלפון: 03-925-3900
פקס: 03-921-5322

מדבקת
מטופל

הנחיות להכנת מודולן IBD בריכוז 20% (1 קק"ל/מ"ל)

יחס פורמולה : מים
1 כפית לכל 35 מ"ל מים
6 כפיות (50 ג') : 210 מ"ל

להכנת מנה של: _____ **מ"ל**	
1. כמות מים (מ"ל)	
2. מספר כפיות (כפית מקורית)	
3. לערבב ולהגיש	

במידה ונדרשת תוספת מיוחדת

תוסף	ריכוז	מספר כפיות/מ"ל למנה	הוראות מיוחדות:
בייבי-קלורי			כפית מקורית - גדושה
דייסת אורז / דייסת קורנפלור			בכפית המקורית של הפורמולה
שמן קנולה			מזרק
שמן MCT			מזרק
סוכר ענבים			כפית מטבח

- מומלץ להשתמש בשייקר, לצורך התמוססות טובה ואחידה של האבקה
- יש להשתמש בפורמולה בתוך שעה מרגע החימום / תחילת האכלה
- המשך מעקב דיאטנית במסגרת הקהילה / ביה"ח

בברכת רפואה-שלמה,

_____
(חתימת הדיאטנית)