

## הנחיות לבדיקת חלבון בשתן בסטיק (ALBUSTIX)

הורים יקרים,

בדיקת חלבון בשתן בסטיק מתבצעת על מנת לזהות נוכחות חלבון בשתן. הבדיקה תבוצע על פי הנחיות הרופא המטפל ולאחר הדרכה מתאימה.


### שלב 1

יש לבדוק את תאריך התפוגה של המוצר (שימוש בסטיק מעבר למועד התפוגה עשוי להציג תשובות לא נכונות).	יש לפתוח את קופסת הסטיקים, ולאחר הוצאת אחד הסטיקים, יש לסגור מיד את מכסה הקופסה.	יש לאחוז את הסטיק מקצהו החופשי, חשוב מאוד להקפיד לא לגעת עם היד בכרית הסטיק.
--	--	--

### שלב 2

לביצוע הבדיקה, יש לטבול את הסטיק בדגימה משתן טרי ולהוציא מיד. בזמן הוצאת הסטיק, יש לנגב שתן עודף על שפת כלי השתן.

### שלב 3



יש להמתין 60 שניות, ולאחר מכן יש להתאים את סטיק הבדיקה למקרא הצבעים שעל הבקבוק. אין לקרוא את הבדיקה לאחר מעל 2 דקות, מכיוון שאז הבדיקה מאבדת מערכה האבחנתית.

### שלב 4

יש לכתוב את התוצאות.	כאשר נמצא בבדיקת השתן חלבון או כל ממצא אחר שאינו תקין (צבע, מראה עכור, ריח לא אופייני), חשוב להתייעץ עם רופא. באופן תקין, שתן טרי הינו בעל מראה צלול.
----------------------	---

### מהם תנאי האחסון?

אין להשתמש לאחר תפוגה שעל גבי המוצר. יש לשמור את המוצר בטמפרטורת החדר, בין 15-30 מעלות צלסיוס.

### היכן ניתן לרכוש את המוצר?

ניתן לרכוש את המוצר בסניפי בתי המרקחת עם מרשם רופא. ללקוחות הכללית, מומלץ לבדוק קודם דרך האפליקציה של הכללית בסמארטפון, האם המוצר נמצא במלאי בבית המרקחת הקרוב למקום מגוריכם.

בברכת רפואה שלמה  
צוות המרפאה הנפרולוגית

שימו לב: תוצאות תקינות אינן שוללות בעיה רפואית ולכן חשוב להיות במעקב רפואי מסודר.



לשאלות ופרטים נוספים:

המכון לנפרולוגיה, טלפון: 03-9253692 | פקס: 03-9253511 | דוא"ל: nephro-sch@clalit.org.il  
מרכז שניידר לרפואת ילדים, רח' קפלן 14, פתח תקווה | www.schneider.org.il